

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Buscopan 10 mg obložene tablete hioscinijev butilbromid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Buscopan i za što se koristi?
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Buscopan?
3. Kako uzimati Buscopan?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Buscopan?
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Buscopan i za što se koristi?

Buscopan sadrži hioscinijev butilbromid koji je polusintetski alkaloid beladone iz skupine kvarternih amonijevih spojeva. Ima spazmolitičko djelovanje (uklanja grčeve) na glatkom mišićju probavnog sustava, žučnih puteva i urogenitalnog trakta.

Buscopan se primjenjuje u slučaju grčeva u probavnom sustavu i urogenitalnom traktu, te grčeva i otežane pokretljivosti žučnih puteva.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Buscopan?

Nemojte uzimati Buscopan:

- Ako ste alergični na hioscinijev butilbromid ili neki drugi sastojak ovog lijeka naveden u dijelu 6.
- Ako postoji sumnja da imate začepljenje crijeva ili Vam je začepljenje crijeva potvrđeno
- Ako imate stanje (koje se naziva paralitički ili opstruktivni ileus). u kojem su Vam crijeva začepljena i ne rade kako treba. Simptomi uključuju tešku bol u trbuhu uz izostanak stolice i/ili mučninu i povraćanje.
- Ako bolujete od određenih poremećaja u debelom crijevu (megakolon-vrlo proširena crijeva).
- Ako bolujete od određenih mišićnih bolesti (mijastenija gravis).
- Ako imate glaukom uskog kuta (očni poremećaj).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Buscopan:

- ako otežano ili bolno mokrite (npr. muškarci s problemima s prostatom)
- ako imate konstipaciju
- ako imate ubrzan rad srca (tahikardija) ili drugi problem sa srcem (srčana insuficijencija, zatajenje srca ili idete na operaciju srca)
- ako imate problema sa štitnjačom kao što je preaktivna štitnjača (tireotoksikoza)
- ako imate vrućicu

Ako teška, neobjašnjena bol u trbuhu traje dulje razdoblje ili se pogorša, ili se istodobno pojave simptomi poput vrućice, mučnine, povraćanja, promijenjenog pražnjenja crijeva, boli u trbuhu na pritisak, sniženog krvnog tlaka, nesvjestice, ili krvi u stolici, morate se odmah obratiti liječniku. Liječnik će vas uputiti na odgovarajuće dijagnostičke pretrage kako bi se pronašao uzrok abdominalne boli.

Ako se bilo koji od gore navedenih poremećaja odnosi na Vas ili ste od njih ranije bolovali, posavjetujte se sa svojim liječnikom prije primjene Buscopana.

Djeca

Ne preporučuje se primjena Buscopana u djece mlađe od 6 godina.

Drugi lijekovi i Buscopan

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Buscopan obložene tablete mogu pojačati učinak nekih lijekova, stoga obavijestite liječnika ako uzimate sljedeće lijekove:

- tri- i tetraciklički antidepressive (lijekovi za liječenje depresije)
- antihistaminike (lijekovi protiv alergije te mučnine tijekom vožnje)
- antipsihotike (lijekovi za liječenje duševnih bolesti, npr. butirofenon, fenotiazin)
- kinidin i disopiramid (lijekovi za liječenje poremećaja srčanog ritma)
- amantadin (lijek za liječenje Parkinsonove bolesti)
- lijekove koji se koriste kod problema s disanjem kao što su tiotropij i ipratropij ili spojeve slične atropinu
- metoklopramid (lijek za liječenje mučnine i povraćanja)
- beta-simpatomimetike (lijekovi za liječenje zatajenja srca ili astme)

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Potrebno je izbjegavati primjenu Buscopana tijekom trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Moguća je pojava poremećaja vida u nekih bolesnika prilikom primjene Buscopana. Ako se to dogodi Vama, pričekajte da Vam se vid popravi/prilagodi prije nego počnete upravljati vozilima ili strojevima.

Buscopan sadrži saharozu

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati Buscopan?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je:

Odrasli i djeca iznad 12 godina starosti:

1 do 2 obložene tablete Buscopana (10 do 20 mg) 3 do 5 puta dnevno.

Djeca od 6 do 12 godina starosti:

1 obložena tableta Buscopana (10 mg) 3 puta dnevno.

Tablete se uzimaju cijele, s čašom vode.

Stariji bolesnici, bolesnici s oštećenjem bubrega i bolesnici s oštećenjem jetre

Kod starijih osoba, bolesnika s oštećenjem bubrega i bolesnika s oštećenjem jetre nije potrebno podešavanje doze.

Primjena kod djece ispod 6 godina starosti

Buscopan nije prikladan za djecu mlađu od 6 godina.

Potrebno je savjetovati se s liječnikom prije primjene lijeka u djece.

Buscopan se ne smije uzimati na svakodnevnoj osnovi, stalno tijekom duljeg razdoblja.

Ako uzmete više Buscopana nego što ste trebali

Ako ste uzeli više Buscopana nego što ste trebali, odmah se obratite svom liječniku ili u najbližu bolnicu. Uzmite pakiranje ovog lijeka sa sobom.

Ako ste zaboravili uzeti Buscopan

Ako ste zaboravili uzeti dozu lijeka, uzmite je čim se sjetite. Međutim ako je vrijeme za Vašu sljedeću dozu, preskočite propuštenu. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Odmah prestanite uzimati lijek i obratite se svom liječniku ako Vam se jave sljedeće nuspojave:

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

- Alergijske reakcije poput kožnih reakcija, npr. koprivnjača, svrbež, osip, crvenilo kože
- Ubrzan rad srca (tahikardija)

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

- Problemi s mokrenjem, nemogućnost mokrenja (urinarna retencija)

Nuspojave nepoznate učestalosti (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

- Anafilaktičke reakcije i anafilaktički šok - Teške alergijske reakcije koje se mogu manifestirati osipom, koji svrbi, po cijelom tijelu. Također se može javiti oticanje, otežano disanje, te osjećaj nesvjestice ili omaglice.
- Otežano disanje
- Bolne crvene oči uz gubitak vida

Prilikom primjene Buscopana mogu se javiti i sljedeće nuspojave:

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

- Suhoća usta
- Zatvor
- Poremećaj znojenja

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: **navedenog u [Dodatku V](#)**.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Buscopan?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek čuvati na temperaturi ispod 30° C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Buscopan sadrži?

Djelatna tvar je hioscinijev butilbromid. 1 obložena tableta sadržava 10 mg hioscinijevog butilbromida.

Pomoćne tvari: kalcijev hidrogenfosfat, bezvodni; kukuruzni škrob; tekući škrob; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; tartaralna kiselina; stearatna kiselina; povidon; saharoza; talk; arapska guma; titanijev dioksid (E171); makrogol 6000; karnauba vosak i vosak, bijeli.

Kako Buscopan izgleda i sadržaj pakiranja?

20 obloženih tableta (1x20) u neprozirnom PVC/PVDC/Al blisteru ili prozirnomo PVC/Al blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelja odobrenja:

Opella Healthcare France SAS
157 avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Francuska

Proizvođač:

Delpharm Reims
10 rue Colonel Charbonneaux
51060 Reims
Francuska

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

STADA d.o.o.
Hercegovačka 14,
10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 3764 111

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u srpnju 2023.